


● ● ● En el caso del personal de salud se realizará siempre una prueba diagnóstica, independiente de si es sintomático o no y su estado vacunación.

\*Son las personas con priorización en la toma de pruebas, dado que tienen un diagnóstico o condición de base que incrementan el riesgo de la gravedad de la COVID-19 como, embarazo, HTA, DM ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cancer, AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TR, en el caso de personas con inmunosupresión el tiempo de aislamiento será superior y estará determinado por el criterio médico. Estos tiempos de aislamientos no aplican para personas inmunosuprimidas, hospitalizados ni con enfermedad grave (ver sección de lineamiento).

\*\*Se recomienda uso obligatorio de tapabocas de tipo quirúrgico durante y después del aislamiento.

\*\*\*Fiebre que no se controla en casa, dificultad respiratoria.

**Nota: mantener en todos los escenarios uso obligatorio y completo de EPP, distanciamiento social y lavado de manos.**



● ● ● En el caso del personal de salud se realizará siempre una prueba diagnóstica, independiente de si es sintomático o no y su estado vacunación.

\*Número de dosis de acuerdo a la indicación fabricante de la vacuna.  
\*\*De acuerdo con los criterios de toma de pruebas en personas sintomática.s  
\*\*\*Pendiente dosis depende de fabricante de la vacuna.  
\*\*\*\*Se recomienda uso obligatorio de tapabocas de tipo quirúrgico durante y después del aislamiento.

**Nota: mantener en todos los escenarios uso obligatorio y completo de EPP, distanciamiento social y lavado de manos.**